



# 幼貓 指南

## 請注意

本書旨在提供讀者資訊，並非做為取代獸醫諮詢及治療之獸醫醫療手冊。  
建議幼貓需定期接受獸醫健康檢查。

Royal Canin SAS出版  
[www.royalcanin.com](http://www.royalcanin.com)

未獲出版商、作者及所有權人書面同意，以任何形式複製本書刊任何部分，均屬違反國家及國際知識產權法，可能因此構成侵權行為而被刑事檢控。若僅供自用並且沒有共享使用意圖，針對重要、具教育意義的合理分析及部分引用，可允許進行複製及重新製作，在相關條件下不屬於違反國家及國際知識產權法。

對於在乎貓咪的家庭來說，牠們是他們一生的好伴侶。我們的理念建基於作為負責任的飼主的四項簡單原則，將協助您與愛貓間建立長久及獨特的穩定關係。




### 知識

保持對貓咪的好奇心，認識貓咪行為並了解其溝通方式，是讓您與幼貓建立良好關係的關鍵。



### 尊重

了解並尊重您愛貓的獨特性，明白人類須為馴養貓咪的幸福擔負重任。尊重您的愛貓，應隨時滿足牠們的基本需求，讓牠們有機會展現與生俱來的風采。



# 幼貓 指南

# TEN

## 教育

一個令貓咪覺得熟悉而有規律、並能讓牠們在某程度上控制環境及進行社交互動的居所，有助減輕壓力並使牠們有能力面對任何挑戰。改善愛貓生活環境，可增進牠們的生理及心理健康。

## 照護

抽空與愛貓一起玩耍，提供必要的照護及關注，並帶牠們去看獸醫：照顧您的愛貓，意味著您需要關注牠們一生的健康及幸福。

# 1/ 迎接新成員

## 愛貓的新家 P.8

提供所有必要的裝備 P. 12

佈置新家 P. 14

陪伴愛貓成長的第一步 P. 16



# 2/ 健康 P.20

選擇度身訂造的營養計劃 P. 24

確保獸醫對愛貓做全面健康追蹤 P. 42



## 3/ 幸福生活 P.50

認識並了解您的幼貓 P. 54

讓幼貓的生活更加豐富，讓牠們的生活更幸福 P. 66

維持幼貓的衛生習慣 P. 72







# 迎接新成員 愛貓的新家

● — 提供所有必要的設備

● — 佈置新家

● — 陪伴愛貓成長的第一步

**在新家的  
最初體驗會  
影響幼貓  
的一生**

**在這個  
重要階段幼貓  
較為脆弱，牠們需要  
安全感及被保護  
的感覺**

**幼貓需要  
一個安全的家，  
讓牠們可自信地  
探索新環境**

**歡迎成為家庭一員！**  
**對於幼貓、您及家庭成員而言，**  
**幼貓初到貴境是大事。**  
**怎樣才能幫助幼貓順利融入新家？**

---

### **迎接新幼貓回家的重要時刻！**

無論牠們是來自繁殖場、收容所、寵物店或您的朋友，第一印象十分重要，將影響您與幼貓之間的長期關係。請安排有充足時間照顧幼貓的時間迎接牠，例如週末或休假日。

**對您而言這是一個奇妙的時刻，**  
**對幼貓卻可能是充滿壓力的改變。**

幼貓剛離開母親的保護及兄弟姐妹，正在經歷新的環境、聲音及氣味等種種不同變化。這段期間請控制您的情緒及興奮感。



# 提供

## 所有必要的裝備

給新幼貓的必需品包括餵食和飲水用的碗、貓砂盤、床、貓跳台、貓抓柱、玩具，當然還有幼貓的第一餐！您可以在寵物店、經由獸醫或網上商店買到這些必需品。

### 如何安排牠們的餵食區和飲水區？

- 至少需要兩個碗：一個較小的碗用來盛載食物，另一個較大的碗經常保持一定分量的清潔的飲用水。由於不鏽鋼碗更加耐用且容易清洗，值得多花一點錢購買。兩個碗之間應維持一定的距離，以防止食物掉入水中，並遠離貓砂盤。水碗可換成給水器，以鼓勵幼貓飲水。如果您的家有多層樓，最好每層樓都放置一組食器。若家中有多隻貓，需提供貓咪個別的進食區以確保每隻貓的隱私需要，並預防因爭食造成的任何壓力。

### 怎樣準備牠們的睡眠區？

- 幼貓需要大量睡眠時間，在屋子一些舒適的（包括在讓牠們覺得安全的較高位置擺放枕頭、毯子、籃子來準備舒適的窩（雖然牠們會選擇自己最喜愛的地點！））。在屋子多個地點安排這些睡眠區，可供家中多隻貓咪分開使用，或讓一隻貓咪有多個選



## 如何滿足幼貓的天性？

玩耍是許多年輕動物學習的方式，幼貓也不例外。坊間有很多貓玩具，您可以買回來鼓勵貓咪在玩樂中學習。只使用專為幼貓而設計的玩具，因為這些玩具更安全耐用。由於貓咪喜愛抓撓，如果您想保持窗簾和傢俱完好，最好為幼貓提供專用的貓抓柱、室內貓跳台或貓抓墊。您可以在貓抓柱上噴貓薄荷，吸引牠們使用貓抓柱。除了這些用品以外，幼貓也需要適合奔跑的地方，以及例如桌子、櫥櫃、架子、梳化椅背等能夠跳上跳下的設施。

## 如何選擇合適的貓砂？

確保貓砂盤的尺寸適合您的幼貓，好讓牠們使用時不會弄得一塌糊塗。必須定期頻密地清理貓砂。每天早晚使用貓砂鏟清除排泄物，並每隔1-2天更換貓砂及內襯。如想減少氣味和預防貓砂被踢出盤外，可考慮使用有蓋的貓砂箱。一開始提供幼貓有蓋和無蓋的貓砂箱，讓牠們可以自由選擇。如果是多貓家庭，您需要為每隻貓在不同的、安靜的地點個別放置貓砂盤。一般守則是提供貓咪數量加1的貓砂盤(亦即，如果有1隻貓，需要2個貓砂盤，如果有2隻貓，需要3個貓砂盤，如此類推)。

# 佈置

## 愛貓的新家

幼貓剛到家時，可能會覺得孤單，為了減輕壓力，必須盡可能為迎接新成員做好準備。以下是一些可讓牠們感到安全放心的簡單提示。



### 尊重幼貓的地盤

---

貓咪天性愛乾淨，喜歡讓貓砂盤遠離食碗和水碗。貓砂盤必須放在合適並遠離其他家庭成員的房間。

確保牠們在家裡都有多個窩可以藏身或休息。

不要試圖將牠們安置在特定房間睡覺，牠們會自己選擇休息的地方，而且有時候會選在非常特別的地方！幼貓需要大量睡眠，請勿吵醒或打擾休息中的幼貓。



家中有許多東西會危及幼貓，  
請花些時間改變，讓幼貓的生活環境  
更加安全。

## 室外

首先，限制幼貓進出露台或花園等地方會比較安全，也要留意打開的窗戶。這樣您的幼貓才能自在地探索。

檢查確認您所有的植物是否有毒，百合等的某些特定植物對貓咪的毒性很高，可以請獸醫提供需要有毒植物的清單。

## 屋內

確認幼貓可到的所有房間皆安全無虞。幼貓出牙時會咬任何物品，因此需將電線收好或藏在看不到的地方，並用安全蓋保護電源插座。收好所有可能會被吞嚥的小物件，例如橡筋及圖書釘，不要隨意放置膠袋或泡棉等物。將所有藥物、殺蟲劑、除草劑和毒鼠藥鎖好。由於幼貓可能會鑽到任何地方，請使用有蓋垃圾桶、隨時蓋好馬桶蓋、並在打開動洗衣機/乾衣機之前檢查幼貓有沒有躲在裡面。



# 陪伴


## 愛貓成長的第一步

幼貓初到家時，務必安排好所有細節，以協助牠們在家中安頓下來，您應該耐心讓牠們逐步探索新環境並自我調整。

### 如何協助幼貓 探索新家？

- 1 新來的幼貓在剛開始的幾個晚上可能會哭泣，畢竟牠們才剛離開母親及手足，因此一開始感到有點害怕很正常。

選擇一個安靜的房間，讓幼貓先在裡面待幾天，可以幫助牠們逐漸適應新環境及新家的氣味。將貓砂盤放在這房間內，方便進行排泄訓練。讓幼貓進出家中其他地方時需從旁監察，幼貓具有強烈的好奇心，您很難想像到牠們有多快會遇險！







## 怎樣準備好讓 幼貓與孩子 第一次接觸？

- ..... 幼貓是教導孩子承擔責任及如何照顧動物的最佳教材。但即使這樣，一開始最好不要讓孩子與幼貓單獨相處，雖然有時孩子並無惡意，但可能會笨手笨腳或對動物太過粗魯。您應向孩子說明幼貓不是玩具，牠們需要大量睡眠，而且不應只為了拍撫而喚醒牠們。

您可以向孩子示範如何安全地接近和抱起幼貓，鼓勵他們使用玩具與幼貓一起玩耍，這可以讓大家都樂在其中，是很好的互相親近體驗。

---

對幼貓要小心，  
突然或粗魯的動作可能  
會嚇怕牠們。抱起幼貓的  
最佳方式是，從幼貓肚子  
側面用手掌托好，  
而用另一手撐住牠們的屁股。

---

如果您家中已有寵物，該怎麼辦？

**黃金定律：目前家裡的寵物是「地主」，因此沒有必要改變牠們的習慣。也不要過度關注新成員，這可能會讓家裡的寵物感到被冷落。**

讓幼貓逐步接觸家中的其他成員，仔細觀察並且保持耐性。



## 家中已有養狗的話

應經常留意原有犬隻與新幼貓之間的互動，第一次接觸時，選擇有地方可以躲藏的房間，讓幼貓有安全感。

讓犬隻保持冷靜並繫上狗繩，沒有必要太急切，不要強迫牠們接觸，而應等到雙方都習慣彼此的存在。

如果您的犬隻已經認識貓而且喜歡牠們，這個過程會容易得多。



## 家中已有養貓的話

---

如果家中已有養貓，請您小心並逐步向牠介紹新幼貓，比起其他成年動物，成貓通常較能接受幼貓。確保每隻貓都有安全區或空間，當牠們感到不安全時可以躲藏；因此務必在全屋內不同高度，提供多個可以躲藏和休息的地方。由於貓咪不喜歡分享，確保為每隻貓提供自己的睡眠區、食碗和飲水碗、玩具、貓砂盤。不要試圖在相鄰的位置餵食牠們，以為這樣可以協助幼貓順利融入。一起進食不是貓的社交習慣，同時餵食牠們可能會造成很大的壓力。



**貓咪以嗅覺認識世界！  
用一塊軟布抹拭幼貓臉頰和  
前額的臉部收集分泌物，  
並塗抹到其他房間的牆腳，  
讓「地主」貓咪習慣幼貓  
的氣味。**



# 健康

- 選擇度身訂造的營養計畫
- 確保獸醫對愛貓做全面健康追蹤

**飲食在  
幼貓健康中  
擔當重要  
角色**

**成長中的  
幼貓需要特殊  
和度身訂造  
的飲食**

**在幼貓到家後  
定期帶幼貓看  
獸醫相當重要**

監察幼貓的健康是  
幼貓主人最重要的責任，  
在幼貓整個成長期間  
仍需持續監察直到成年。

怎樣從小給貓咪一個健康的好開始？

---

要幫助牠們在新環境中  
健康成長，先要充分了  
解您的幼貓。

為了預防幼貓出生後  
最初個月可能出現的  
健康問題，**確保從小到大的  
每個成長階段，都為牠們  
選擇度身訂造的健康營養  
餐單**，並由獸醫密切觀察及  
定期檢查。健康的幼貓是成貓  
健康的基礎！



# 選擇

## 度身訂造的健康營養計畫

幼貓的飲食旨在提供成長必需的重要營養。透過嚴格選擇與測試的養份有助良好的消化吸收及健康。

### 為何我們無法以人類的飲食方式 餵食愛貓？

雖然貓咪與人類之間的關係密切，但貓咪對食物的需求與人類有很大差別。

人類可於每餐不同的食物組合中攝取養分，但這種持續多變的飲食方式不適合貓咪的消化系統，牠們在野外的主食為鳥類及鼠類。

讓我們看看人類於貓科動物在消化系統和生理上有什麼不同：

- > 牠們的下顎專門用來撕開食物而非咀嚼。
- > 牠們的食物由胃中的強酸消化，並無在口腔內以唾液預先消化的過程。
- > 牠們的消化道約佔全部體重的3%，食物只需12-24小時即可通過腸臟。相比人類的消化道佔體重的11%，而食物通過腸臟可能長達5天，可明顯看出為甚麼人類可以容易接受及同時消化多種不同食物，而不會感到不適。





### 從營養觀點而言：

> 貓咪的對蛋白質需求非常高：比犬類的需求高，是人類的兩倍。與大部分哺乳類動物不同，貓咪無法製造一種重要的氨基酸——牛磺酸(蛋白質的組成單元)。飲食中缺乏牛磺酸時，可能會造成生育問題、失明或心臟病。

> 脂肪是貓重要的熱量來源。貓咪與犬隻及人類不同，無法製造花生四烯酸，這是許多生物反應過程中必需的脂肪酸(脂質的組成單元)。

> 貓具特別需要的維他命。

- 貓咪與犬隻及人類不同，無法自行合成維他命A。
- 不像人類可透過曬太陽在皮膚內合成維他命D，貓咪只能從飲食中攝取。

### 就餵食習慣而言：

> 我們人類喜歡在一天內固定時間用餐，慢慢享用美食。貓咪稍微有點不同，在可以選擇的情況下，傾向每天少食多餐，一天進食最高達16次。

**單靠肉類食物營養  
不夠均衡。在野外，  
貓會吃掉獵物的每個  
部分，包括腸臟和經常  
含有植物的腸臟內容物，  
也會吃掉肌腱及角質  
(毛髮、腳爪)。**

## 了解您的愛貓 並滿足其實際需求

1

貓需要每天  
少量多餐  
(一天10至16餐)

貓共有**30顆**  
牙齒 全部都  
很鋒利

貓共有**30顆**  
牙齒 全部都  
很鋒利

味蕾很少，貓對  
味覺並不敏銳，  
而且**無法嚐出甜味**

唾液中沒有  
消化酵素  
(無法進行預消化)


貓需要每天  
少量多餐

2

食物  
不經預消化  
便直接到達胃部

3

消化速度快  
未經吸收的食物  
會大量出現在糞便中



貓胃中所含的  
鹽酸是人類的六倍

貓的小腸  
有1公尺長

雖然大腸很短  
(20-40公分)  
但食物移動速度很慢  
(至少20小時)  
未消化的食物會在  
這裡發酵

## 吃還是不吃？

貓非常挑食，因此飲食不單要滿足牠們的年齡及特定的營養需求，更須適合牠們的口味。

貓咪在野外是獨行獵手，沒法得到同類試食經驗，因此牠們必須非常小心地選擇食物，根據牠們過去的採食經驗，每隻貓都會對特定食物產生特殊偏好，而同時拒絕其他類別的食物。了解貓咪如何選擇食物偏好的方式，能指引您選擇牠們最喜愛的食物，除此以外，口味合適的食物也會在生病期間等重要時刻起到關鍵作用。

貓咪在決策過程中  
會動用所有感知能力：

### > 聽力和視力：

- 貓對音域的感受範圍比人類寬3倍，能夠聽到非常微弱的聲音。
- 貓咪的視野廣闊、視網膜更新率高、擁有3D視覺以及夜視能力，讓貓咪無論日夜都能夠清楚區分移動的物體。

### > 敏銳的嗅覺：

- 嗅覺對貓在選擇食物喜惡的影響力遠高於味覺，如果氣味夠吸引，牠們就會吃掉。
- 嗅覺功能變化會改變食物選擇，而嗅覺喪失或減退會導致拒絕進食。



### > 觸覺：

- 食物的顆粒大小和形狀會影響是否能輕易咬住，這對於短頭品種(如波斯貓)特別重要。
- 貓咪臉上的某些觸鬚可幫助牠們區分不同質感。

### > 味覺：

- 雖然這是貓咪發展最差的感官，但在選擇食物時仍扮演重要角色，可讓牠們嚐出苦味、酸味、鹹味及感到美味，幼貓在出生10天後就能區分出這些基本味道。
- 可能由於作為肉食動物的貓科在進化過程中失去感受甜味的能力，牠們不會受到糖的吸引：如果牠們舔您吃完的麥片碗底，那是因為牛奶中所含的蛋白質，而非麥片的甜味所致。
- 牠們對特定苦味分子非常敏感，這是需要避開的大部分有毒物質之特徵。

### > 餐後感：

貓咪用餐後的感受，也會強烈影響牠們的偏好。感覺越正面，未來貓咪受到相同食物吸引的可能性越高。

雖然人類的味覺感受很強，但貓咪並不是這樣，因為牠們的味蕾比我們少了約95%。實際上牠們是根據氣味和質感決定是否喜歡一種食物。





## 對水也很挑剔！

---

有些飼主從來沒看過他們的貓咪喝水，便以為貓咪不喜歡水。事實上因為貓咪是從在沙漠遊蕩的動物進化而來的，這些動物從獵物取得所需的大部分水分，因此確實沒有頻繁喝水的強烈自然衝動，如果牠們對現有的水源沒興趣，會乾脆不喝水。但這不表示牠們不喜歡喝水，攝取足夠水分對於維持泌尿道健康非常重要。



---

### 您知道嗎？

當有不同食物可以選擇時，貓咪能夠自行選出讓牠們得到良好及營養均衡的食物！

還有，根據觀察，發現貓咪有三種不同的攫取方式，主要與貓咪的臉部結構(也就是品種)有關：

- > 唇取(最常見)：開始用嘴唇接觸，然後以牙齒取食。
  - > 舌上模式：貓咪使用舌頭上側，如同舔食一樣。
  - > 舌下模式(短頭品種特有)：貓咪使用舌頭下側接觸飼料，然後向上翻轉後送。
- 

## 為甚麼不適合用成貓糧喂飼幼貓？

- ..... 難道人類嬰兒可吃成人的食物？當然不行；嬰兒的消化系統脆弱，下顎較小而且沒有牙齒，因此，舉例來說無法直接吃蘋果。比較兩個物種的特異性，有助於了解為甚麼幼貓需要與成貓不同的飲食。

幼貓的成長期持續至少12個月，根據品種和性別而定，體型越大的品種，達到成年體重所需的時間越長，由於雄性體型通常比雌性大，成長期會多出幾個星期的時間，成長期是貓咪一生中最重要階段，不僅可養成未來的行為模式，也會將身體塑造成成長時的樣貌，幼貓長至成年時，體重會達到出生體重的40-50倍。

**最初幾個月，營養帶來的影響十分重要。**  
幼貓第一年內的成長可分為2個階段，  
且對營養的需求有所不同。

**> 從出生到4個月大**

在這個階段，幼貓會經歷急速且特別脆弱的成長期，期間很容易發生消化不良。在這個關鍵期間，飲食不僅應富含熱量以滿足成長的需要，也應是易於消化以配合幼貓尚未成熟的消化系統。

**斷奶**是從液體食物(母乳)轉為固體食物的過渡期，正好是幼貓約3至6個星期大、乳齒脫落時，在這個階段，幼貓仍無法咀嚼食物，因此粥狀食物(泡濕的乾糧或調製過的濕糧)有助促進從液體轉至固體食物之間的轉換，雖然斷奶過程通常會持續到幼貓7個星期大才完結，但幼貓可從約4到5個星期大時開始食用固體食物。事實上，**從約4個星期大開始，幼貓透過模仿母親，會逐漸嘗試固體食物。**

為了更順暢地轉糧，可以溫水或奶製品浸軟幼貓乾糧，並調成均勻粥狀。接著應該逐漸減少液體分量，直到幼貓能夠吃乾糧為止。





### > 從4個月到12個月大

- 骨骼結構逐漸變得更強韌。
- 肌肉量增加。
- 消化和免疫系統逐步成熟。
- 幼貓的乳齒脫落換成恆齒(在4至7個月大之間)  
恆齒長出來後，幼貓需要顆粒夠大的飼料，  
以鼓勵牠們咀嚼。



若沒有選用營養均衡的貓糧，幼貓可能會營養不良或過剩，有機會產生慢性疾病及造成長期健康問題。餵飼合適的貓糧並持之以恆，可為牠們的長遠健康打好基礎。

**幼貓是成長中的貓咪：  
食物的組合、質感和  
顆粒大小，必須符合  
牠們的年齡需要。**

為了幼貓的消化、生長並增進活力著想，必須精確調配均衡的營養和分量，提供適合牠們生理及消化的食物。



在幼貓初生的前幾個月：  
熱量...很重要 但切勿過量！

成長受許多因素影響，而良好的營養擔當著重要角色，食物不僅可提供幼貓熱量，食物內所含的養分也可用於**骨骼、肌肉、器官的生長及強化**。幼貓的成長非常快速，因此必須提供牠們**很高熱量的食物**，牠們在12個星期大之前需要持續不斷的大量熱量，每公斤體重消耗的熱量是成貓的三倍(200-250 kcal/kg)。

**成長高峰期會在4至5個月大之間**，此時幼貓每星期會增加約100克體重。然後生長速率會減慢，但熱量需求仍然相當可觀。無論如何，只增加重量不是個好主意，因為可能會讓仍然未成熟且脆弱的消化系統負荷過重，也可能造成體重超標，而過重的幼貓難以健康成長，餵飼您的愛貓超過建議分量的話，會導致肥胖並增加罹患糖尿病的風險。

有規律地餵飼適合幼貓營養需要的食物，有助確保均衡飲食並預防超重和肥胖。





## 消化：初生後幾個月內敏感的課題

新生幼貓的消化道非常適合消化母乳，但在生長過程中會逐漸喪失消化乳糖的能力。和一般人的想法不同，**幼貓及成貓均不適合飲用牛奶**。在斷奶時期，幼貓的消化能力因為尚未完全發育，酵素分泌有限，但在成長過程中消化系統會日益成熟。

若幼貓無法進行消化，便無法自飲食中吸收足夠養分，會容易感到疲倦且無法正常成長。優質飲食提供配合全方位成長所需的養分，而且更容易讓幼貓消化，全面吸收。



## 「免疫空窗期」是幼貓出生後的關鍵階段

在出生前，幼貓在母貓的子宮內安全而溫暖。

出生後，幼貓的免疫系統仍未成熟，需來自母貓初乳的抗體。母貓抗體的含量會在幼貓出生後的12個星期內開始減少。

與此同時，幼貓在初生的幾個星期會開始探索新世界，逐步建立自身的免疫系統以抵抗不同抗原，包括接觸到的細菌或舉例說疫苗。這段時間內，來自母貓的免疫保護日漸不足，而幼貓自身的免疫系統又未發育完成，受到感染的風險會較高，因此稱為「免疫空窗期」。

這個階段的飲食必須包含特定的**抗氧化物及益生菌**，幫助幼貓渡過這青黃不接的時期，同時加強牠們的天然免疫力。

一個強大的免疫系統是幼貓長成為美麗健康成貓的基礎。維持免疫系統均衡，有助多方面提升健康，不單可強化幼貓對抗感染和疾病的能力，更可以增進牠們的全面健康。

## 剛到家中的幼貓 應該餵食甚麼？

突然改變飲食可能會造成消化不良，提早讓幼貓體驗一種食物對日後飲食偏好的構成非常重要。因此務必避免突然改變幼貓的食物，這樣不單會帶來消化上的壓力和腹瀉的風險，也可能導致牠們將來討厭新食物。在帶幼貓回家前請收集牠飲食和餵食方法的資訊(每天進食次數、是否定量餵食還是能夠自行隨意進食)，並在牠們到新家安頓下來的時候，維持這些飲食習慣，如果幼貓有熟悉的食物，會比較容易適應新環境。

牠們從搬家的不安中恢復過來後，如您想改變飲食可在此時進行。為避免引發消化上的壓力，請在一星期內逐漸混合新舊貓糧，慢慢增加新糧的比例，直至第七天可完全換成新糧。請記得無論在貓咪生命中任何時候需要換糧，都須遵循此過渡過程。

### 第1&2天



- 75% 目前的飼料
- +25% 新飼料

### 第3&4天



- 50% 目前的飼料
- +50% 新飼料

### 第5&6天



- 25% 目前的飼料
- +70% 新飼料

### 第7天及以後



- 100% 新飼料

## 我該選擇甚麼樣的貓糧？

若以自製食物餵飼幼貓，將難以確保食物中是否全面涵蓋幼貓成長所需的必要養分。選擇來自寵物專門店或獸醫診所的高質產品，這些食物營養全面更可立即餵食。**確保飲食適合您的幼貓在2個成長階段期間對營養需求的變化**：第一階段從0至4個月大，而第二階段從4個月大到一歲，合適的健康營養飲食會包含抗氧化物、維他命及特定的氨基酸，可增強幼貓的天然免疫能力，貓糧有不同的質感(濕糧或乾糧)，若使用不同的碗餵食，也可以每天乾濕糧混餵。**請記得貓糧顆粒的質感和形狀和是否容易攫取，是會影響幼貓飲食偏好的。**我們建議在成長階段提供幼貓不同質感的貓糧，這樣可幫助牠們在成年時能接受不同食物，**豐富牠們的飲食體驗。**健康營養配方是精心調製，遵循調製人類食品相同的健康及安全規格，因此符合最高的品質及食品安全標準。



---

### 健康飲食在幼貓身上的明顯好處？

- > 活力充沛
  - > 食慾正常
  - > 形態良好的糞便，無消化不良情況出現
  - > 各方面發育協調
  - > 毛皮光滑
- 

---

### 哪些是看不到的效果？

雖然在表面上看不出來，但是營養對於增強身體的天然抵抗力的作用非常重要！嚴重缺乏維他命及微量元素，會影響幼貓的保護性免疫反應的發展，從而造成牠們更容易生病。

---

## 在甚麼地方、甚麼時候以及用甚麼方式餵飼幼貓？

貓咪喜歡在遠離關注和獵食者，而且有容易逃脫路徑的安靜地方進食：選擇遠離貓砂盤的安靜地點，讓幼貓不受打擾地進食。

- > 務必餵食適合幼貓年齡的類型及數量食物，請確保遵循包裝上餵食指南的份量。
- > 由於濕糧會變乾而令口感不佳，請勿閒置超過一小時。

貓咪的祖先是非洲野貓，是一種獨行獵食者，針對無法預測的獵物數量及營養價值的不確定性，牠們已演化出自行調節的進食習慣。這項演化仍會影響現今貓咪的飲食習慣：如果每日的食物有多餘分量留下供貓咪食用，牠們會在一天內回到碗邊約10至16次，每次只食用少量食物。

> 如果幼貓可自行安排飲食的次數，在一天內少量多次地進食，您可以一次給予整天分量，讓牠們按自己少吃多餐的習慣進食。

> 但如果幼貓有每餐一次吃光的傾向，最好將每日分量分為許多小份。為了符合貓咪的行為需要，使用餵食玩具會有幫助。斷奶後可開始使用餵食玩具，以滿足牠們的天性，並建立主動的進食習慣。每天向牠們展示玩具如何運作，直到牠們能夠自行使用為止(平均需12天)。這可讓用餐時間變得有趣刺激







## 幼貓會喝多少水？

貓咪喝水不多，從演化觀點看來，貓咪的野生祖先住在沙漠地區，能夠濃縮尿液及避免水分流失。食物類型會影響飲水量，乾糧所含的水分不多（不到10%），而部分濕糧含超過80%的水分，因此濕糧的含水量通常已能滿足幼貓的水分需要。無論您提供幼貓哪種貓糧，都應鼓勵牠們喝水，這對牠們的健康有益。

> 務必確保幼貓咪可取得乾淨的清水(但水溫不要低於10°C)，最好在屋內不同地方放幾個水碗。貓咪會隨機性飲水，很少特意跑去找水源。透過一些試驗，您可以發現幼貓在屋內喜歡停下喝水的地點。

> 將水碗放在遠離餵食和貓砂盤區域。對於貓咪而言，進食及喝水是完全分開的事。從演化觀點看來，這樣可避免食水受到獵物屍體上的蟲子污染的風險。

> 使用陶瓷、金屬或玻璃水碗，許多貓咪不喜歡塑膠碗內的水的味道。最好使用較寬較淺的碗並裝滿到碗邊，這可讓貓咪在喝水時，用眼睛余光保持對周圍環境的警戒。

> 如果您有超過一隻貓，確保有足夠的水碗數量以免發生爭執，貓咪不喜歡排隊！

> 經常換水以保持新鮮。許多貓咪喜歡流動的水，這項習性可確保食水乾淨且未受污染。市面上出售的飲水器對這些貓咪很有幫助。

# 確保

## 獸醫對愛貓做 全面健康追蹤

幼貓的醫療監察包括獸醫的專業建議及飼主的定期觀察，  
獸醫就是幼貓的兒科醫師！

### 如何監察成長過程？

- ..... | 為了確保幼貓快高長大，我們建議定期測量體重，以觀察每次體重較上一次測量時的增幅。您可以使用嬰兒體重計或廚房用的料理秤，在幼貓滿兩個月後，每兩星期一次(兩個月大之前每星期一次)在每天相同時間為幼貓量重。根據品種的不同，幼貓每天應增重10至30克，若體重停止增加或下降，必須在斷奶後以配方幼貓乳品或適當食品補充營養，請諮詢獸醫建議。

### 幼貓應每隔多久接受 獸醫檢查一次？

- ..... | 將幼貓帶回家後，務必儘快到獸醫診所進行首次看診。首次看診後，即使幼貓看起來健康，仍有必要定期由獸醫進行健康檢查、基本照護、體重監察、疫苗接種、進行合適的杜蟲計畫。隨時備妥獸醫和急診電話。

## 怎樣選擇獸醫？

在選好幼貓前先選好獸醫可節省很多時間。若您尚未選好獸醫，可詢問家庭成員或朋友對這方面的建議。最重要的一點是選擇一位能與您和貓咪建立長久關係的獸醫，讓你們可以一起為愛貓的健康把關。與獸醫專家建立互信，對幼貓的健康監察相當重要。

您需要考慮的事項：

- > 診所距離您家的遠近，以及如需要開車時診所附近是否可以泊車。
- > 診所配備的設施、設施的乾淨程度和保養情況如何，以及提供的照護水準。
- > 診所員工，以及他們之中是否有任何人精於貓科醫學。
- > 他們提供的緊急醫療服務。
  - > 有否提供「貓科」門診，或者獨立的貓咪等候區；這樣您的愛貓就無需擠在擠逼的等候室內與許多狗狗待在一起。
  - > 有否提供任何額外服務，例如護理門診、衛生教育資料、美容等。



## 照護愛貓一個 極重要部分是**預防性健康照護** 這需要從小開始

### 身分識別

---

在某些國家，販售或領養的所有貓咪須強制性進行身分識別，一般由獸醫以紋身或植入晶片方式作為身分識別。身份識別相當重要；萬一幼貓走失或遭竊，身份證號碼可提供飼主資料及聯絡方法。

**考慮到幼貓在您居住地承受的外在風險，獸醫是唯一可協助您選擇疫苗接種計畫的人。**

### 疫苗接種

---

疫苗可加強貓咪的自身免疫力，對抗傳染性或致命疾病。幼貓通常在8個星期大開始接種疫苗，這時幼貓不再受來自母體的抗體保護，特別容易生病。獸醫會進行全面的醫療檢查，以判斷幼貓的健康狀態是否已適合接種疫苗。首次接種後將有接續的常規追加劑，對抗不同疾病的疫苗，其免疫功能的有效時間長短不一，因此您的愛貓不一定每年都接種相同的疫苗追加劑。





## 體外寄生蟲治療

幼貓很容易感染外寄生蟲：跳蚤和蜱蟲是微小的生物，會黏附在幼貓的皮膚上咬破皮膚吸血，可能會引起嚴重的感染疾病；耳蟎是耳道中的細小蟎蟲，會造成耳朵痕癢和極度不適；環狀癬(由微小的真菌引起)會攻擊貓咪的毛根。如果在貓咪身上找到成年跳蚤，需要以不會對幼貓造成傷害的滅蚤產品處理全屋，以完全清除在任何生命週期的跳蚤。對於蜱蟲，最好的做法是定期檢查幼貓(尤其是長毛品種!)，並移除發現的所有蜱蟲。蜱蟲可使用特殊鉗子移除，但記得向您的獸醫諮詢有關這方面進一步的建議。

**由於寄生蟲可透過多種方式進入您的家中，所以即使室內貓種也需要預防寄生蟲。**



## 對抗體內寄生蟲的杜蟲計畫

體內寄生蟲包括在寄生於體內的蠕蟲及原蟲(微小的單細胞寄生蟲)，會造成脹氣、消化問題或毛色暗淡，部分寄生蟲更會傳染人類(尤其是兒童)並造成健康問題，因此務必嚴格執行杜蟲計畫。杜蟲計畫必須在幼貓2至8個月大期間定期進行，之後每年進行一次。由於幼貓的免疫系統尚未完全發育，幼貓比成貓更容易感染到寄生蟲，因此會假定所有幼貓都帶有寄生蟲，獸醫會從您第一次約診開始建議定期杜蟲計畫。

# 準備

## 帶您的幼貓第一次 看獸醫

要照顧好您幼貓的健康，獸醫不會單憑臨床診斷而作出判斷，也需要您提供有關幼貓飲食與生活習慣方面的資訊。



如果繁殖場或中途之家有向您提供幼貓的健康紀錄，就診時請務必攜帶及交獸醫參考。



在就診之前，請記得記錄幼貓飲食相關資訊(廠牌、分量等)，並記錄您注意到的任何變化(食慾、排便、行為等)。


3

如果貓咪不習慣外出，可將貓籠打開放在屋內，讓幼貓可以在裡面睡覺和玩耍，以幫助減低外出當天的壓力。牠們會在裡面留下自己的氣味，這會比較容易鼓勵牠們在您需要時進入貓籠。


4

在診所的接待區和等候室，讓貓籠的前端面向您(而不要面向其他的貓狗!)，並且用毛巾蓋住貓籠。

## 怎樣避免幼貓越來越肥？

- ❶ 缺乏體能活動的室內生活，加上餵食過多，是導致越來越多貓咪過重或肥胖的主因。為維持幼貓的理想體重，請留意幼貓飼料包裝上建議的餵食指引，並遵照指引分量分配，必須自我克制給予幼貓超過包裝建議的分量，限制零食，也不要讓牠們吃剩菜，還有，不要用減少分量的方法來預防體重增加，因為減少分量會導致營養失衡，可考慮使用餵食玩具誘使幼貓多活動以獲取食物，為牠們在屋內提供大量攀爬機會，也不要忘記定期與牠們一起玩耍，監察進食和體重增加非常重要，遵循獸醫建議的理想熱量水平及分量餵食，可減低貓咪過重或肥胖的風險。

---

### 您知道嗎？

針對32隻成貓進行的多個進食實驗顯示，食物碗的大小會影響進食的分量。同樣的食物分量，以兩倍大的碗餵食的貓咪，吃下的分量明顯高於使用正常食碗進食的貓咪，因此較小的碗有助於限制體重過度增加。

---





**絕育是任何寵物飼主應作出的最負責任的決定。不僅可以限制流浪貓數量的升幅(這是造成貓咪收容所經常爆滿的主因)，對貓咪的長遠健康和行為舉止也很有好處。**

> 絕育是一種在全身麻醉下進行的手術，可減低貓咪罹患某類癌症的風險，並減少雌貓罹患某些特定且通常會危及生命的子宮感染的風險，也可減少雄貓的地盤標記行為、抑制雌貓發情，若您的愛貓會跑到戶外，絕育可減少打架及被傳染疾病的機會，降低貓咪尋找交配對象時的風險(車禍、中毒等)，從而提高存活率。

> 幼貓的成長非常迅速，適合絕育的平均年齡大致與性成熟期差不多，依品種及幼貓出生季節而異，雌性大約在6/7個月大，而雄性在6至12個月大之間。請與獸醫討論替幼貓進行絕育手術的最佳時間。

> 絕育會影響激素分泌，絕育後48小時內，貓咪每日的食量會開始增加(雄性+26%，雌性+18%)，同時熱量消耗會減少約30%。若手術後沒有嚴格控制並調節飲食，體重可能會迅速增加。如果幼貓的居住空間小並缺乏體能活動，過重的風險會進一步增加。

這會帶來雙重的營養挑戰：應調節飲食以提供必要養分，同時避免體重問題。可在手術前開始引入新貓糧，讓貓咪不必同時經歷看獸醫及換糧的雙重壓力。

**遵循獸醫的建議，注意幼貓的飲食並確保牠們保持一定的活動量。**



# 幸福生活

- 認識並了解您的幼貓
  - 豐富幼貓的生活  
令牠們活得更幸福
    - 多元的環境可讓幼貓的生活更幸福

**幼貓具有  
強烈的好奇心  
又愛玩**

**早期  
群體生活會  
影響成貓行為**

**多元的  
環境可讓  
幼貓的生活  
更幸福**

**了解驅使貓咪溝通**  
**及互相交流的誘因，**  
可讓您跟幼貓建立良好的  
關係打好基礎。

---

雖然貓咪們很獨立，牠們仍然需要大量關注及情感，不應長時間獨處，這會讓剝奪牠們所需的關注及激勵。您必須每天抽空陪伴幼貓，包括週末。



# 認識 並了解 您的幼貓

讓幼貓接觸外界不同的刺激，可鼓勵牠們對生活更好奇且開放，出生後14個星期內對於貓咪融入社群特別重要，在這期間幼貓所經歷的事件對牠們成長後的行為模式造成長遠影響，並影響日後的友善程度。



## 環境對幼貓的影響

---

良好的環境包括可讓幼貓輕易融入社群，熟悉與牠們有關的不同人和物。應讓牠們接觸不同年齡的人，把牠們介紹給其他動物，並感受不同強度的噪音，環境的刺激越多，幼貓成長會越均衡。





## 與母貓及手足的早期群體生活

幼貓出生後四個星期的最初接觸對像是母貓及兄弟姐妹。母貓在幼貓的教養中扮演重要角色，透過示範及玩耍教導牠們衛生和一般社交行為，餵哺幼貓，讓牠們守規矩，安撫及保護牠們。出生後這幾個星期的正面群體交流，已證實能左右幼貓成長期間的合群程度，幼貓需要在武器(牙齒和爪)發育完成之前，儘早了解什麼事情可以做及什麼事情不可以做，與手足打鬧期間受到的模擬攻擊(咬和抓)，有助牠們判斷動用牙齒和爪時應使出的攻擊強度。

對於由母貓餵養的初生幼貓，建議等候至少2個月再分開，以避免提早斷奶對幼貓造成壓力，讓牠們有時間從母貓及手足處獲得適當的社交經驗。



## 取代幼貓母親的角色

您的角色在新環境中完成對幼貓的教育極為重要，教導牠們循規蹈矩，這樣您們才能和諧共處。新幼貓抵達家中時，為牠們準備好成功融入家中的環境，必須防止牠們進入可能製造麻煩的區域，確保牠們在您的監督下與家中成員、其他動物及物件進行正面而輕鬆的互動。您現在正取代母貓的位置，有責任讓牠們清楚在玩耍時嚴禁出爪或嚙咬。提供大量機會讓牠們跟家庭成員和其他人有身體接觸，例如梳理和撫摸，可確保幼貓長大後成為友善的貓咪。在檢查耳朵、嘴巴和四肢時撫摸牠們全身，會令牠們更放鬆及舒服，這會讓牠們和您在看獸醫時輕鬆得多。此外，也有助確保牠們與人互動時，尤其是孩子們的安全。



## 我可以訓練幼貓嗎？

雖然一般認為貓是「無法訓練」的動物，但事實上牠們學習特定行為的能力很強，只要耐心和使用正面強化的方法還是能夠做到的。有效的訓練有助避免衛生問題，以及飼主與寵物之間可能出現的緊張關係，也是讓幼貓獲得所需心智刺激的絕佳方式。

幼貓的學習方式有兩種：模仿母貓的動作，以及自行摸索。在後者的情況下，牠們必須接受自己行為的後果，如果牠們喜歡這些後果，會傾向重複這些行為，如果您決定在訓練期間使用貓零食，請確保零食不會佔每日攝取熱量的10%以上，以避免體重過度增加。

由於牠們對於視覺提示(身體語言、姿勢)很敏感而非語言提示，牠們會透過觀察您的態度及姿勢了解您的感受，甚至估計您將會做甚麼。訓練幼貓時，採用明確及一致的訊號交流，使指令更容易理解。





## 如廁訓練

---

許多幼貓透過觀察母貓的行為學習如何使用貓砂盤。為了讓排泄訓練效果更好，應了解幼貓之前使用過哪種貓砂，如果想改變貓砂類型，請採用循序漸進的方法。確保貓砂盤放在可輕易到達的地方，並需要是家中安靜的區域，遠離臥室和食物碗及水碗。如果幼貓到家時還未接受過排泄訓練，讓牠們站在貓砂盤上，並用牠們的一隻前爪抓搔貓砂，最好在幼貓進食後或睡醒後立刻做，如未能成功而幼貓沒有使用貓砂盤，可嘗試使用不同的貓砂或貓砂盤(例如有蓋貓砂盤或盤邊較淺的貓砂盤)，排泄時表示放鬆的身體語言，例如尾巴輕鬆抬起、耳朵向前且略為朝向側邊，是表示偏好的良好指標，貓砂盤需經常及定期清潔，每天清除一次排泄物，每星期清洗一次貓砂盤並更換貓砂。

## 避免抓搔

---

用爪子抓屋內物品是幼貓的正常行為，但對飼主來說是難以接受的。教育應從小開始，簡單地說「不行」加上彈手指或拍手，通常就足以修正這種行為，對於待在室內的幼貓，可在屋內各處安放貓抓柱，有助於預防傢俱或窗簾被抓壞。



## 幼貓的個性如何？

每隻幼貓都是獨一無二的，了解幼貓的個性、喜好和厭惡，有助培養出對雙方都有利的關係。

這些測試可簡單迅速助您了解幼貓的個性。

### > 鋁箔球測試

在幼貓面前用鋁箔搓成一個球，但小心不要讓鋸齒邊緣傷到牠們！如果牠們對鋁箔球的反應很慢，可能表示牠們對會動的物體感到緊張或漠不關心。讓幼貓獨處時，請記得提供更適合牠們的玩具。

### > 噪音測試

在幼貓可完全看到您的位置大聲拍手，如果牠們表現出好奇又能保持冷靜，表示牠們之前曾在有豐富刺激的環境中生活。如果牠們跑開，應注意讓牠們儘量接觸日常生活中的各種噪音，好讓牠們可以習慣您家中的聲音。





### > 合群性測試

遠距離觀察幼貓：

如果牠們跑過來玩您衣物上的飾帶，或者在您身上磨蹭，表示牠們已經懂得合群。如果牠們表現膽怯並在您向牠們移動時試圖跑開，可能仍未學會交際，或者天性害羞，務必讓牠們再次進行社交訓練。除了提供玩具並抽出更多時間跟牠們一起玩耍以外，也必須確保在家中與人、其他動物及物件有輕鬆和良好的互動。

**與幼貓一起玩耍  
以深入了解牠們。**

**幼貓對您的身體語言及  
行為非常敏感。**

**如果發現幼貓抓咬，  
堅定但溫和地責罵牠們。**

### > 觸摸測試

仰躺時樂於讓您撫摸牠們腹部的幼貓，會很溫順且容易相處，但如果牠們掙紮或試圖使用爪子，這個跡象表示，基於牠們的個性，其動作可能難以預測，例如嘗試用嚙咬來回應撫摸。

## 幼貓如何溝通？

- 幼貓會透過四種方式與您不斷溝通：觸覺、嗅覺、視覺(身體和臉部)、聲音。



### 觸覺交流

選擇近距離接近其他寵物和人，是貓科動物表達相互之間感情的表現。異體磨蹭(Allorubbing)是兩隻貓互相磨蹭。異體整理毛髮(Allogrooming)或互相整理毛髮是一種互惠行為，通常在衝突發生後的妥協行為，有時也會是玩耍的前奏。揉捏是幼貓揉捏您的膝蓋和及大腿一段較長時間，這是在表達強烈的愉悅感，並再度喚起母親哺育牠們時感受到的快樂。



### 嗅覺標記

用氣味標記是自然的行為及一種溝通方式，可能用於警告其他動物不要侵入，表達焦慮，或反之用來標示牠們的領地邊界。幼貓會透過磨蹭、抓搔和噴尿留下氣味。

#### > 磨蹭

氣味腺體位於幼貓的臉部、尾巴和腳掌上，這些腺體會分泌費洛蒙，是幼貓在成長過程中留在熟悉環境裡會留下的化學物質。

將臉部和身體對物體、人、其他動物磨蹭而留下氣味，這是一種安慰行為，反映出幼貓的安全感，幼貓透過在您周圍輕碰及掠過這種方式，來顯示將您納入牠們的活動範圍內。但小心不要將這種行為誤解為要求餵食：這類錯誤解讀是貓咪肥胖問題的重要因素。

### > 抓搔

幼貓在物件上抓搔時，不只是透過去除變鈍的爪子外鞘而讓爪子保持鋒利，除在物件上留下可見的痕跡以外，也會透過腳掌上的氣味腺體留下氣味。若抓搔發生在幼貓進入或離開一個地方時，可能是缺乏安全感的表現，這時需要適當改變環境，協助牠們重建較強的安全感。

### > 噴尿

幼貓通常會在6個月大性成熟時，開始噴尿到垂直的表面上。這種行為為可能源自壓力或習慣改變，是為了對任何入侵者進行驅趕和令其產生恐懼；通常在絕育後便會停止這種行為。貓咪也可能以糞便堆積作為嗅覺標記，經常會出現在策略性地點。



## 視覺交流

---

這類交流一般在雙方距離較遠時使用，並包括姿勢和臉部表情的組合。從身體姿勢可得到貓咪情緒狀態的第一印象，顯示出恐懼程度和侵略性，但臉部可作出的細微表情，可最快告訴您貓咪的情緒改變。

### > 身體姿勢

#### 弓背

這是貓最為人熟悉的威嚇姿勢，用來作出體型變大的印象，對可能的敵意接觸的表達信心。這是一項防禦性的姿勢，表示預期衝突發生，經常伴著尾部炸毛抬高，令體型看來更大。

#### 蹲伏姿勢

隨著威脅越來越接近又無法採用威嚇方式，原本處於防禦狀態的貓咪會採用蹲伏姿勢，這個姿勢會伴隨重心轉移到腳掌上，做好迅速撤離的準備。

#### 交際性翻滾

當幼貓完全放鬆時，會透過側向翻滾邀請其他貓咪和人類進行社交性接觸，這種翻滾與貓咪完全翻身背貼地面，以便能使用四條腿作防衛的防禦性翻滾不同。

#### 甩尾巴

當幼貓被激怒時會甩尾巴。如您撫摸幼貓而牠們開始甩尾巴，請立刻停止，因為這表示牠們不喜歡您的動作。



### > 臉部表情

眼睛的形狀及位置可精確表達牠們想的情緒。

- 平靜的貓咪：耳朵向上打開，眼睛圓睜。
- 憤怒的貓咪：耳朵直接扭轉到側邊，眼睛眯起來。
- 準備攻擊的貓咪：耳朵向下，瞳孔擴大變圓。
- 快樂的貓咪：耳朵豎起及向前打開，眼睛半閉，瞳孔為狹縫狀。



---

### 鬍鬚的重要性

千萬不要剪掉貓咪的鬍鬚，牠們利用鬍鬚對環境進行觸覺探索，例如評估通道寬度，也用於與其他動物交流。

---







## 聲音訊號

貓咪用聲音表達情緒狀態。

### 呼嚕聲

幼貓發出呼嚕聲時，通常表示牠們很滿足，但牠們感到焦慮或不適時也可能會發出呼嚕聲，包括生病時，因為呼嚕聲在有壓力時有安撫作用。

### 咆哮聲和嘶嘶聲

這是一種威嚇戰術，會在攻擊時使用。

### 喵叫聲

喵叫聲分為很多種，每種都有獨特的意義，透過觀察幼貓可學會辨別這些聲音的意思。喵叫聲不一定表示饑餓，也可能表示幼貓想要引起您的注意或想跟您玩耍。

## 如何評估幼貓 有多幸福？

..... 1 貓咪是否放鬆且願意互動的行為表徵，包括緩慢地眨眼、呼嚕聲、臉部磨蹭、接近並緊貼您身邊，以及放鬆地向側面翻滾。

貓咪不幸福的指標，包括表現出焦慮和恐懼，以及因壓力造成的行為改變：攻擊性、破壞性行為、過度梳理毛髮和不斷叫喚、自殘、食慾降低、減少理毛、探索及玩耍的頻率、躲起來或社交互動減少。這時應立即諮詢獸醫或寵物行為學家。

# 豐富

## 幼貓的生活 令牠們更幸福

即使幼貓的活動及休息週期經常急速變換，睡眠時間仍佔很大部分：每天平均睡眠時間為13至16小時。活動時間的高峰出現於清晨及黃昏，此時牠們主要專注於玩耍、理毛、進食，以及享受關注。



### 睡眠和休息

---

幼貓的身體會在睡眠期間分泌必要的生長激素，因此切勿打擾牠們的睡眠。此外，您需考慮到幼貓睡眠時也是免疫系統強化的時期。

請確保您的屋內在多處安靜、溫暖、乾燥且沒有氣流的地方，都有舒適的窩讓幼貓睡覺，貓窩不要遠離家庭成員生活中心，但需避開有人來人往來的繁忙區域。

同時也請準備開放式貓籠讓幼貓休息：讓牠們熟悉貓籠並將其視為平常的傢俱，有助減輕看獸醫時的壓力。



## 玩耍

建立良好關係需投資時間去陪伴和分享經驗，因此抽空與幼貓一起玩耍，可強化彼此之間的紐帶，玩耍可製造機會讓幼貓更幸福感並強化正面行為的愉快方法，玩耍可同時協助幼貓的生理機能及認知能力發展，可消耗牠們的精力，也是對抗孤單的妙法。

對貓而言，玩耍與狩獵行為類似，會受到獵物特性刺激，例如體型細小、移動迅速及有複雜的表面花紋的獵物。最好的玩具可讓幼貓模擬狩獵行為的不同階段(潛伏接近、尾隨、身體後部擺動、脖子繃緊、弓背及猛撲)，這對牠們特別吸引。



### 有趣安全地玩耍的 4個秘訣：

1. 在幼貓充分休息後，以及主動找人互動時才玩耍。
2. 使用專屬玩具取代手腳，以避免幼貓長大時認為手腳是可以攻擊的。
3. 如果幼貓在玩耍期間變得粗魯並開始抓咬，立即停止玩耍。
4. 經常替換玩具好讓幼貓持續受到刺激。

## 運動

---


體能活動是增強幼貓肌肉、維持骨骼強健及健康體重的基礎，也是讓幼貓得到健康和幸福感所需的心智刺激的好辦法。可讓牠們奔跑、攀爬、在高處棲息、跳躍、猛撲、磨爪，以及與懸掛或活動的物件(紙球、玩具、內含鈴鐺的硬球等)運動會較適合貓咪。確保幼貓有適當的地方讓牠們奔跑，超過一公尺高的物體都可以是幼貓的遊樂場：牠們可以跳上去的貓跳台、櫥櫃、架子、桌子、梳化椅背。對待在室內的幼貓，無論透過與飼主玩耍或獨自玩貓玩具，都能夠鼓勵牠們進行體能活動，貓玩具和貓跳台是為室內幼貓提供娛樂活動的好工具，也免得牠們覺得無聊。

請注意，室內幼貓通常比較安靜，因此飲食方面要符合其較低的活動量。

## 棲息在高處的貓是快樂的貓！

---

幼貓很喜歡待在高處，在哪裡牠們會感到比較安全，且觀察環境更方便。還有，若幼貓待在與您的臉位於相同高度的地方，可讓牠們以同等地位與您磨蹭。在理想情況下，每間房間都應該有一個高台，給幼貓安坐及俯瞰屋內每個角落、睡覺和休息。





## 整理毛髮

---

整理毛髮與睡覺同樣是幼貓最喜歡的活動之一：牠們可能花費多達30%的清醒時間梳理毛髮，幼貓通常會在約15日大時開始自行梳理，牠們會使用自己粗糙的舌頭自行清潔，但也會使用前後爪。以舌頭沾濕前爪，作為清潔耳朵之前的頭部的毛巾。後爪非常靈活，會用作梳理整個背部和耳朵，清潔時會產生腦內啡，令貓咪產生正面感受，例如撫慰感。如果幼貓過度梳理毛髮，這可能是焦慮的現象，必須由獸醫密切觀察。

## 進食

---

貓是獵食者，因此牠們的天性是去獵取食物。刺激性餵食方法及食物的變化，可令幼貓的豐富進食體驗，首先，將食物藏在多處地點及餵食玩具內，是鼓勵幼貓探索環境，以及勞力獲取食物的可行方法。其次，不同的食物種類可切合牠們的天性，因為牠們的野生祖先經過演化後，能進食具有不同質感、香味、味道的食物。

因此除簡純的口味變化，幼貓也會喜歡不同香味及質感的食物。按指引混合濕糧(軟質感和香味強烈)和乾糧(有口感的顆粒)，既可讓幼貓獲得所需的養分，也能享受多樣化的飲食體驗，令牠們感到更加幸福。結合乾糧與濕糧對健康也有好處，乾糧的質地可減少牙斑，濕糧可自然增加每日水分攝取量，幫助稀釋尿液，並產生更高的飽肚感，從而促進泌尿道健康及維持理想體重。



## 多貓家庭

只要滿足貓咪們對環境的需求，大部分貓咪都可以快樂地活在同一屋簷下。當某隻貓的活動範圍影響到其他貓咪的正常活動時，便會產生行為問題，例如廚房是某隻貓活動範圍的其中一部分，但也是離家外出的唯一途徑，若因第一隻貓需要保護自己的活動範圍，第二隻貓便可能受到阻止而無法出門。為預防因此造成壓力，需提供多個在不會發生衝突地點，讓牠們能各自進行日常活動(進食、喝水、使用貓砂盤和睡覺)，及保有個別生活資源(食碗和水碗、貓砂盤及休息的地方)。可增加寵物的活動範圍，又能減少因競爭而引發的衝突。



**多元環境是維持幼貓  
均衡發展的關鍵，可提供  
大量機會進行體能活動、  
心智刺激、天性的表現  
(探索和玩耍)。獸醫會提供  
營造適當的環境建議：用於  
攀爬的垂直表面(貓跳台和  
攀爬架)、藏匿地點、讓貓咪  
練爪的材料等。**

# 維持

## 幼貓的衛生習慣

### 怎樣照護幼貓的口腔健康？

幼貓到家時，仍長有相當脆弱的乳齒，因此應調整貓糧的質地，例如可加水浸濕乾糧。從小開始主動照顧幼貓口腔健康，可預防牙菌膜形成而導致牙周病。恒齒上可能會出現牙菌膜，導致口臭及形成牙石。牙石會逐漸造成牙齦炎，最終導致牙齒脫落。若牙石形成，唯一的辦法是將貓咪帶到獸醫診所進行洗牙。讓幼貓從小習慣使用特別設計的貓用牙刷和專用牙膏刷牙，有助未來口腔健康。

貓咪可能沒有明顯口腔疼痛及不適的症狀，多留意並定期獸醫檢查(1歲開始每6個月一次)，對於口腔疾病的處理非常重要。

### 怎樣清潔幼貓的眼睛、耳朵和鼻子？

#### 眼睛

使用小塊紗布和專用清潔液(可向獸醫購買)清潔幼貓的眼睛。

#### 耳朵

最重要的原則是儘量不要觸碰耳朵，如果耳朵髒了，塗抹少量專配方乳液並輕輕按摩耳朵外側，絕對不要使用棉球或水或酒精溶液清潔貓咪耳朵。

如果有明顯看起來異常的分泌物，請帶幼貓看獸醫以便作出準確診斷。

#### 鼻子

有些貓咪的鼻孔附近可能有乾掉的鼻分泌物，您可用眼睛專用乳液或生理鹽水沾濕溫暖的棉花球或紙巾輕易拭去這些分泌物。



---

幼貓在2個月大時通常有26顆乳齒。  
恆齒從4個月大開始長出時，您可能會發現  
地上有奇怪的乳齒，但幼貓通常會將這些乳齒吃掉，  
這是完全正常的行為！約6個月大時，  
幼貓會有共30顆牙齒。

---



## 如何照護幼貓的毛皮？

您可定期梳毛維持幼貓毛皮光滑健康，也有助於找出潛伏的體外寄生蟲如跳蚤和蟬蟲。除了保持毛皮光潔外，梳毛也可以除去折斷的毛髮，減少貓咪自己吞下的毛髮數量。毛髮越長，幼貓越容易吞下毛髮，而可能在胃部形成毛球。這些毛球通常會經由糞便從體內排出，不過有時候毛髮會在胃部累積，貓咪便會經嘔吐排出毛球。短毛貓通常只需每週梳理一次，而中長毛幼貓每天梳理毛髮較好。室內幼貓的理毛時間比戶外幼貓更頻密，由於室內的溫度相對穩定使得貓咪全年都會持續換毛，因此定期幫助刷毛對牠們特別重要。

梳理毛髮前可先朝毛髮反方向按摩，以去除脫落的死毛並刺激皮膚。使用的刷子和梳子類型會因不同的毛皮而異，獸醫或寵物美容師會建議最適合幼貓的刷子。**請不要忘記梳理耳朵後面和脖子後方，之後抱抱幼貓或跟牠們玩遊戲作為鼓勵。**

從小開始讓幼貓習慣抱抱和梳毛的話，這些美好時光很快會成為您們享受彼此陪伴及加強關係的好機會。



## 我應該幫幼貓洗澡嗎？

很少貓會喜歡水，不過中長毛的必須洗澡，因此最好讓幼貓從小開始習慣水。開始時應用浴巾或海綿輕輕將牠們沾濕，如果牠們出現攻擊性反應，不要繼續下去，在接下來幾天內繼續嘗試，直到牠們習慣為止。當牠們習慣水之後，可以使用一碗溫水(36-37°C)輕輕淋濕牠們的背部，但小心不要將水從頭淋下，也不要讓水進入眼睛及耳朵。只使用由獸醫診所或寵物店購買具有適合幼貓皮膚及毛髮的酸鹼度的貓咪專用洗髮水。清潔髒污部分後，用一碗水或在花灑下徹底清洗。可以用溫暖的乾毛巾將牠們包起來，擦乾牠們的毛皮。

## 怎樣安全地修剪幼貓的指甲？

必須讓幼貓在從小習慣修剪指甲，如果爪子的指甲太長，可能因卡住物件而折斷或甚至拉出，導致受傷。若正確修剪指甲方法正確的話是不會疼痛的，更可在家中、獸醫診所或在專業寵物美容店修剪指甲。如要修剪貓的指甲，請務必一次處理一隻爪子，並使用專用的指甲剪，先選擇一個舒適的地點，並將幼貓放到您膝蓋上，輕壓腳掌讓爪子伸出來，剪掉爪子的白色尖端，不要太靠近粉紅色三角形邊緣。


**如果您感到不確定或不放心，可隨時請獸醫示範。**



# 當幼貓 長大時

## 第一生長階段 建設期

## 第二生長階段 鞏固及協調期



## 了解更多有關您幼貓資訊

[www.royalcanin.com.hk/hk\\_en](http://www.royalcanin.com.hk/hk_en)

我們的網站提供大量  
有關大小貓咪最佳  
餵食建議及技巧。



在您喜愛的  
社交媒體上獲取最新  
Royal Canin的資訊

## 絕育

絕育是一個良性手術，目的是防止繁殖，但也能夠延長貓咪的預期壽命。

在大約6個月大時進行，可減少子宮感染、乳房腫瘤及逃家。

## 絕育

絕育是一個良性手術，目的是防止繁殖，但也能夠延長貓咪的預期壽命。

在大約6個月大時進行，可減少子宮感染、乳房腫瘤及逃家。

## 青春期

6至9個月大：嗅覺標記、荷爾蒙分泌、抓撓。

絕育幼貓  
成長飼料

成貓飼料

6個月大  
生長逐漸  
放緩  
以強化骨骼及  
增加肌肉量

7個月大  
絕育後  
幼貓一般會  
增加食量  
但同時熱量需求  
減少超過30%

8個月大  
尚未成年  
8個月大時  
幼貓體重達到  
成年體重的80%

12-15個月大  
生長板閉合  
表示生長完成：  
幼貓現在  
已經長大

## 為了世界各地的寵物，Royal Canin® 承諾 建立更好且永續的世界。

寵物讓我們的每一天更加精彩。我們致力於在世界各地，提供最好的高品質營養配方及服務。更好的世界即為健全的地球，才是適合寵物及飼主生活的環境。因此，我們支援承諾以永續方式選配及繁殖動物的繁殖業者，同時確保動物們的健康及幸福。



# Royal Canin<sup>®</sup>

## 幼貓系列(乾糧)

體重			
體型	初生	幼貓	幼貓
	Babycat milk	First Age Mother & Baby Cat	Second Age Kitten
年紀	初生至4個月大	4-12個月大	6-12個月大
產品			
	初生幼貓奶粉	初生幼貓	幼年貓
供應包裝	400g, 2kg, 4kg	400g, 2kg, 4kg	2kg, 4kg, 10kg

<b>幼貓</b>	<b>幼貓</b>	<b>幼貓</b>
Persian	Maine Coon	British Shorthair
12個月或以下	15個月或以下	12個月或以下
		
<b>波斯貓幼貓</b>	<b>緬因貓幼貓</b>	<b>英國短毛貓幼貓</b>
<b>2kg, 10kg</b>	<b>10kg</b>	<b>2kg, 10kg</b>

# Royal Canin<sup>®</sup>

## 幼貓系列(濕糧)

體型	初生	初生	初生	初生
	Mother & Baby Cat	Kitten	Kitten	Kitten
年紀	哺乳母貓及初生	12個月或以下	12個月或以下	12個月或以下
產品				
	初生貓濕糧	幼年貓	幼年貓	幼年貓
供應包裝	195g (慕斯)	85g (肉汁)	140g (啫喱)	140g (肉塊)





